УДК 616-057+616.711:001.5

БОЛЬ В СПИНЕ КАК ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Вознищына К.Б.

Институт медицины труда АМН Украины, г. Киев

Проведен анализ проблемы диагностики синдрома боли в нижней части спины, вызванной патологией костно-мышечной системы. Рассмотрена роль неблагоприятных физических факторов в развитии указанной патологии с учетом патогенетических механизмов болевого синдрома. Высокая медико-социальная значимость проблемы в клинике профессиональных заболеваний предопределяет необходимость ее междисциплинарного изучения с дальнейшим пересмотром перечня заболеваний опорно-двигательного аппарата профессиональной этиологии.

Ключевые слова: радикулопатия, диагностика, боль, миофасциальный синдром, остеохондроз

Боль в поясничной области, как и головная боль, относится к наиболее частым жалобам, с которыми обращаются больные к врачам самых разных специальностей. В течение жизни она возникает у 7–9 человек из 10 [1, 8]. В настоящее время заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) занимают одно из ведущих мест в структуре как общей, так и профессиональной патологии [5]. Сравнительные данные приведены на рисунке 1.

Существует огромное множество причин возникновения болей в спине, среди которых можно выделить две большие группы: вертебро- и невертеброгенные. Вертеброгенные причины обусловлены в основном дегенеративно-дистрофическими процессами, затрагивающими межпозвонковый диск, тела позвонков, их мелкие суставы, мышцы, связки. Причинами возникновения болевого синдрома невертеброгенного происхождения могут быть: соматические заболевания, патологические процессы в забрюшинном пространстве, травмы, артроз тазобедренного сустава, заболевания нервной системы, опухоли и инфекционные заболевания, врожденная патология, психические расстройства и др.

Ведущими факторами риска развития боли в нижней части спины (БНЧС, в зарубежной практике — low back pain) являются тяжелые статические и динамические нагрузки на позвоночник и нижние конечности, монотонный физический труд, включая частые наклоны и повороты тела, переохлаждение, вибрация. Указанные факторы производ-

ственного процесса характерны для условий труда многих профессий, что объясняет высокую распространенность этой патологии среди людей физического труда [6, 18]. Наибольшее число последних представлено в угольной промышленности (рис. 2).

Однако, несмотря на такую широкую распространенность болевых синдромов в области спины, отсутствие единых подходов к диагностике, лечению и реабилитации привело к упрощению и обобщению подходов к проблеме БНЧС. Наиболее сложной ситуация оказалась в профессиональной патологии, поскольку согласно существующему «Перечню профессиональных заболеваний» (Постановление КМ Украины от 08.11.2000 г. № 1662), диагнозом, позволяющим связать БНЧС с условиями труда, является хроническая пояснично-крест-

Рис. 1. Доля заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы в общей структуре профессиональных заболеваний.

Рис. 2. Распределение профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы у работающих в различных отраслях народного хозяйства.

цовая радикулопатия. При этом любая другая нозологическая форма, вызвавшая БНЧС, не может быть отнесена к категории профессиональных, так как отсутствует в вышеуказанном перечне, несмотря на выраженную клиническую картину, прогрессирующее течение, длительную утрату трудоспособности. Таким образом, в лучшем случае, врач вынужден «подстраивать» клинику под единственный «профессиональный диагноз», а в худшем — вырабатывается стереотип «диагностического клише» для всех больных с БНЧС независимо от клинической картины.

В данной статье проведен анализ БНЧС, связанной с патологией костно-мышечной системы, как одной из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения. Вместе с тем, вопрос о механизмах формирования болевого синдрома при профессиональных вертеброгенных заболеваниях остается недостаточно изученным.

Определение. Боли в нижней части спины — это боли, локализующиеся между XII парой ребер и ягодичными складками, которые могут иррадиировать в ягодичы и/или ноги с одной или двух сторон. Термин БНЧС в настоящее время широко используется за рубежом. БНЧС включили в МКБ-10 (регистрационная категория М54.5) [7, 16] как симптом, а не диагноз, из-за высокой распространенности и сложности в установлении конкретной причины болей, но с условием обязательного проведения дифференциальной диагностики среди дорсопатий (М50-М54). Для удобства далее мы будем использовать обобщающий термин БНЧС.

История вопроса. XX век внес серьезные коррективы в понимание причин и особенностей формирования БНЧС. Первоначально основной причиной возникновения боли считали воспаление нервных корешков и стволов, что нашло отражение в таких формулировках диагноза, как «пояснично-крестцовый радикулит», «радикуло-неврит», «фуникулит» и др. Еще в 40–50-е годы «радикулиты» нередко лечили массивными дозами антибиотиков.

Но впоследствии инфекционно-воспалительную теорию развития БНЧС стала заменять вертеброгенная, чему в немалой степени способствовали успешные операции по поводу грыжи диска. Причину всех БНЧС стали искать в дегенеративно-дистрофических изме-

нениях позвоночника, в сдавлении грыжей диска нервного корешка. Этому периоду соответствует другая терминология при формулировании диагноза: дискогенный корешковый компрессионный синдром, вертеброгенная радикулопатия, вертеброгенный рефлекторный синдром.

В 80–90-е годы среди неврологов стала превалировать теория преимущественно мышечного происхождения БНЧС, которая нашла выражение в новом симптомокомплексе, получившем название «миофасциальный синдром» [3]. В отечественной клинической практике, особенно в профпатологии, указанному синдрому уделяется недостаточное внимание. Отчасти, это связано с тем, что термин «радикулит» (вульгаризм современного понятия радикулопатия) глубоко укоренился в сознании врача и больного, став практически единственным синонимом боли в спине. Хотя на практике синдром поражения корешка как следствие остеохондроза позвоночника выявляется лишь примерно в 10% всех случаев БНЧС [19]. По данным некоторых авторов, признаки непосредственно радикулопатии выявляются лишь у 2–5% больных [12]. Гораздо чаще источником боли служит раздражение болевых рецепторов мышц, суставов, связок позвоночно-двигательного сегмента (ПДС), т.е. *миофасциальный синдром*. Многие исследователи считают, что практически в 90% случаев причиной БНЧС являются именно миофасциальные синдромы [9]. Это подтверждается исследованиями последних десятилетий: выявляемые с помощью спондилографии, компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии дегене-

ративно-дистрофические изменения позвоночника, считавшиеся маркерами остеохондроза, часто не коррелируют с клинической картиной и встречаются у лиц, не страдающих болью в спине [17]. Таким образом, сам по себе дегенеративный процесс в позвоночнике может считаться лишь предпосылкой к развитию БНЧС, но никак не ее основной причиной. Обязательным условием диагностики того или иного варианта вертебро-неврологической патологии является соответствие клинических и параклинических данных.

Для того чтобы внести ясность в понимание истинных причин развития болей в пояснице и нижних конечностях, необходимо остановиться на анатомических особенностях иннервации элементов позвоночного столба и этапах развития дегенеративно-дистрофического процесса в позвоночнике — остеохондрозе.

Анатомические особенности иннервации позвоночно-двигательного сегмента. Все элементы позвоночного столба имеют мощную сенсорную иннервацию. Иннервируют позвоночник, его связки, суставы, мышцы 3 группы нервных ветвей: 1) задние ветви спинномозговых нервов, 2) менингеальный нерв (синувертебральный нерв Люшке), 3) ветви симпатического ствола, которые образуют густую сеть нервных окончаний, охватывающую все самые мелкие элементы ПДС. Только глубокие слои фиброзного кольца и пульпозное ядро межпозвоночного диска не имеют иннервации. В результате этого в большинстве случаев боль в спине и нижних конечностях носит ноцицептивный местный или отраженный характер, то есть вызывается иррадиацией из поврежденных тканей, окружающих ПДС — мышц, связок, фасций, суставной капсулы (*рефлекторная люмбалгия, люмбоишиалгия, миофасциальный синдром*). Лишь в небольшом количестве случаев боль возникает из-за повреждения спинномозгового корешка или ганглия и имеет чисто невропатическую природу (*радикулопатия*), что и должно быть определяющим для постановки диагноза.

Остеохондроз. Остеохондроз позвоночника — дегенеративно-дистрофический процесс в межпозвоночном диске с реактивным ответом со стороны тел позвонков. Следует отметить, что дефиниция широко распространенного среди неврологов диагноза остеохондроза позвоночника на современном этапе некоторыми, преимущественно зарубежными исследователями, подвергается пересмотру. Так, согласно решениям Международной ассоциа-

ции вертеброневрологов, рекомендуется пользоваться определением «вертебральные дисфункции» вместо более привычного и принятого понятия «остеохондроз позвоночника» [13].

Остеохондроз позвоночника представляет собой сложный каскадный многоэтапный процесс. Отправной точкой его, как правило, служат дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках, которым способствуют повторные травмы, избыточная статическая или динамическая нагрузка, наследственная предрасположенность и др.

На раннем этапе дегенеративного процесса постепенное снижение высоты диска нарушает функционирование всего ПДС. Суставные фасетки в межпозвоночных суставах «наезжают» друг на друга, что может приводить к подвывиху и смещению позвонков относительно друг друга — *спондилолистезу*. Возникающая в итоге нестабильность ПДС повышает чувствительность позвоночника к травме или резким движениям, ускоряет дегенеративные изменения, прежде всего артроз фасеточных суставов — спондилоартроз. Эти изменения часто остаются асимптомными, но при избыточной нагрузке они способны стать источником боли.

С годами межпозвоночный диск постепенно теряет воду, ссыхается, утрачивает амортизирующую функцию и становится более чувствительным к механической нагрузке. Фиброзное кольцо, расположенное на периферии диска, истончается, в нем появляются трещины, по которым центральная часть диска — пульпозное ядро — смещается к периферии, формируя протрузию. Вследствие интенсивной нагрузки протрузия может увеличиваться, что приводит к выпячиванию пульпозного ядра и части фиброзного кольца в позвоночный канал, которое обозначают как грыжа диска.

Впоследствии механическая стабильность ПДС и всего позвоночника может восстанавливаться за счет краевых разрастаний (остеофитов), фиброза дисков и капсулы, анкилоза фасеточных суставов, утолщения связок. Эти изменения завершают «дегенеративный каскад» в позвоночнике и иногда приводят к спонтанному стиханию боли. Но, одновременно, они способны вызвать стеноз позвоночного канала. Кроме того, остеофиты, направленные в сторону спинномозгового канала, могут травмировать корешки, вызывая тем самым стойкий болевой синдром.

Таким образом, на различных этапах дегенеративного процесса в позвоночнике ведущую роль в

развитии болевого синдрома играют следующие патологические процессы:

- А. С вовлечением нервного корешка:
 - грыжа диска.
- Б. Без вовлечения нервного корешка:
 - нестабильность/блокада ПДС,
 - артроз фасеточных суставов (спондилоартроз),
 - спондилолистез,
 - стеноз позвоночного канала,
 - миофасциальный синдром.

В каждом из этих вариантов болевой синдром имеет клиническое своеобразие, различную временную динамику, прогноз и требует особого подхода к лечению [11]. Ниже мы рассмотрим дифференциальную диагностику радикулопатии и других болевых синдромов, не связанных с поражением корешка (стеноз позвоночного канала в силу специфичности клинической картины рассмотрен не будет).

Радикулопатия. Наиболее частой причиной развития радикулопатии является грыжа диска. В редких случаях радикулопатия может быть связана со стенозом межпозвонкового отверстия или позвоночного канала остеофитом или гипертрофированной желтой связкой. У пожилых людей радикулопатия часто бывает результатом сдавления корешка не грыжей диска, а суставной фасеткой при артропатии межпозвонковых суставов. Для характеристики степени выпячивания диска используют следующие термины: «протрузия», «грыжа», «пролапс». Термин «протрузия» обычно используется для обозначения начальной стадии выпячивания диска, когда пульпозное ядро еще не прорвало наружные слои фиброзного кольца, термин «грыжа» — только в том случае, когда пульпозное ядро или его фрагменты прорвали наружные слои фиброзного кольца. Обычно выпячивание диска считается клинически значимым, если превышает 25% передне-заднего диаметра позвоночного канала (примерно 10 мм). Чаще всего грыжи распространяются в дорсальном и дорсолатеральном направлении. Смещаясь в сторону позвоночного канала или межпозвонкового отверстия, грыжа компримирует прилегающий спинномозговой корешок, что ведет к возникновению радикулопатии. Грыжи диска чаще наблюдаются в возрасте 30–50 лет, тогда как у старших по возрасту пациентов из-за фиброза студенистого ядра частота возникновения грыжи снижается.

При пояснично-крестцовой радикулопатии чаще отмечается классическая клиническая картина:

больной ощущает острейшую боль в пояснице, которая возникает немедленно или через некоторое время после травмы или физического напряжения. Боль усиливается при кашле, чихании, сопровождается выраженным спазмом паравертебральных мышц и ограничением подвижности в позвоночнике. Боль иррадирует в ногу, достигая стопы и пальцев — так называемая «длинная боль», чаще в зону иннервации пораженного корешка (боль, ограничиваемая областью спины, исключает корешковое поражение). При осмотре в положении стоя пациент принимает вынужденную позу с наклоном в здоровую сторону, в положении лежа — с согнутой и приведенной больной ногой. Поясничный лордоз сглаживается, возможен алгический сколиоз, опущение ягодичной складки на стороне поражения. Выявляются нарушения чувствительности в зоне иннервации корешка и, главное, снижение или выпадение сухожильных рефлексов в этой зоне, а также снижение силы соответствующих мышц, что является отличительными признаками поражения корешка от рефлекторной люмбоишиалгии. *Необходимо подчеркнуть, что наличие изолированных болей, даже строго в зоне отдельного корешка, недостаточно для постановки диагноза радикулопатии. Врач вправе выставить этот диагноз только при одновременном наличии симптомов выпадения* [4]. Также отметим, что так называемые «симптомы натяжения», в частности симптом Лассега, долго ошибочно связывали с растяжением нерва. В настоящее время достоверно известно, что эти симптомы неспецифичны для поражения корешка, но пригодны для оценки тяжести и динамики вертеброгенного болевого синдрома [2].

Подтвердить наличие грыжи диска и уточнить ее степень можно с помощью нейровизуализационных методов (КТ, МРТ, миелография). Вместе с тем, следует подчеркнуть, что диагностика грыжи диска как причины болевого синдрома возможна лишь в том случае, когда клиническая картина соответствует уровню и степени выпячивания диска.

Помимо радикулопатии болевые синдромы в области спины, могут вызываться, как уже упоминалось выше, и другими причинами, а именно: спондилоартрозом, спондилолистезом, нестабильностью ПДС, стенозом позвоночного канала, миофасциальным синдромом.

Спондилоартроз может возникать: 1) в результате перегрузки задних отделов ПДС, 2) при распространенном остеоартрозе, поражающем суставы позвоночника и конечностей, 3) вследствие де-

генерации и уменьшения высоты диска, приводящих к изменению взаимоотношений суставных отростков, и сопровождаться функциональной блокадой суставов, подвывихом в суставах с ущемлением суставной капсулы, воспалением суставных тканей. Клинически спондилоартроз проявляется двусторонней болью, которая, в отличие от дискогенной, обычно локализуется паравертебрально, а не по средней линии. Боль максимально выражена в пояснице, но нередко иррадирует в крестцово-подвздошное сочленение, ягодицу, бедро, не опускаясь ниже колена («короткая боль»). Как правило, она имеет интермиттирующий характер и усиливается при длительном стоянии, а также в положении лежа на спине [15]. По утрам больные испытывают преходящую скованность. Положительными могут быть и симптомы «натяжения» в результате растяжения суставной капсулы во время поднятия ноги. Характерно усиление боли при разгибании.

Нестабильность/блокада ПДС. Дегенерация диска может приводить не только к грыже, но и к равномерной протрузии диска, уменьшению его высоты и изменению взаиморасположения основных элементов ПДС. Это может быть причиной нестабильности или патологической блокады сегмента. Блокирование межпозвонкового сустава сопровождается появлением гипермобильности в межпозвонковых суставах выше- и нижележащих позвонков. Боль при этом — обычно двусторонняя, усиливается при длительном пребывании в одном положении, наклонах, поднятии тяжести, длительном стоянии и облегчается при сидении. Движения в позвоночнике болезненны, особенно разгибание. Боль иногда иррадирует в крестцово-подвздошное соединение, но не в ягодицу или бедро. Характерны умеренные двусторонние боли при приеме Лассега. Наиболее частой причиной обратимого функционального блокирования является длительно сохраняемое нефизиологическое статическое напряжение, что обычно связано с профессиональной деятельностью.

Спондилолистез — смещение позвонка кпереди по отношению к смежному позвонку. В молодом возрасте чаще обусловлен спондилолизом (дефект межсуставной части дужки позвонка). В пожилом возрасте спондилолистез чаще возникает вследствие дегенерации фасеточных суставов (спондилоартроза). При этом боль может иррадиировать в ягодицу, в паховые области, отмечается болезненность в области тазобедренных и крестцово-под-

вздошных сочленений, как правило увеличивается поясничный лордоз. При пальпации в пояснично-крестцовой области отмечается мышечный спазм и усиление болезненности.

Миофасциальный синдром в паравертебральных мышцах может развиваться на фоне дегенеративного процесса в позвоночнике или независимо от него, в связи с длительным пребыванием в вынужденной позе, переохлаждением, хронической микротравматизацией, перегрузкой, перерастяжением или сдавливанием мышц (чаще всего обусловленным особенностями профессиональной деятельности), травмой, длительной иммобилизацией.

В мышцах всей кинематической цепи позвоночника-конечности под влиянием механических перегрузок и постоянной патологической импульсации из дегенерированного межпозвонкового диска и суставов, перенапряженной мышцы возникает возбуждение сегментарного аппарата спинного мозга. Это проявляется напряжением соответствующих мышц. Длительное тоническое напряжение приводит к ухудшению процессов метаболизма, гипоксии, отеку и изменениям трофики участков мышц, вследствие чего и появляются участки болезненных уплотнений — триггерные точки, служащие достаточно выраженными источниками болевого синдрома [10]. Формируется порочный круг болевой мышечный спазм-боль. Несмотря на тот факт, что миофасциальный болевой синдром может сопровождать многие заболевания, роль дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике и физических нагрузок в генезе его возникновения очень велика.

В постановке диагноза миофасциального синдрома следует руководствоваться следующими признаками: боль связана с физической перегрузкой, длительным пребыванием в одном положении, прямым переохлаждением мышцы; распространение боли наблюдается в области, достаточно отдаленной от напряженной, спазмированной мышцы; в мышцах выявляются плотные, болезненные тяжи; пальпируются активные триггерные точки, при надавливании на которые их болезненность резко усиливается — «симптом прыжка»; присуща устранимость симптомов при специфическом местном воздействии на спазмированную мышцу (местное введение анестетика).

Сравнительная характеристика поражения корешка и рефлекторного мышечно-тонического синдрома представлена в таблице [12].

Таблиця

Сравнительная характеристика поражения корешка и рефлекторного мышечно-тонического синдрома
(Штульман Д.Р., Левин О.С., 2004)

Признаки	Радикулопатия	Рефлекторный мышечно-тонический синдром
Характер боли	Интенсивная стреляющая или пронизывающая	Постоянная ноющая, часто глубинная
Локализация боли	Часто односторонняя, имеет четкие границы, иррадиирует по дерматому, обычно в его дистальную часть	Часто двусторонняя, диффузная, не имеет четких границ, иррадиирует по миотому или склеротому, максимально выражена в области ягодиц и бедер, но иногда «опускается» и ниже колена
Симптомы натяжения	Выражены	Могут присутствовать
Сухожильные рефлексы	Снижены или выпадают в зоне иннервации корешка	Обычно сохранены
Снижение чувствительности и парестезии	В зоне иннервации корешка	Отсутствуют
Слабость и атрофия мышц	В зоне иннервации корешка	Отсутствуют

Суммируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на отсутствие признаков поражения корешка (радикулопатии), многие пациенты страдают выраженным болевым синдромом, сопровождающимся нарушением биомеханики позвоночника, мышечно-тоническими проявлениями, что ведет к длительной утрате трудоспособности.

Таким образом, анализ данных литературы показывает, что боль, вызванная сдавлением корешка, не занимает лидирующее место в структуре БНЧС. Гораздо чаще боли в поясничной области вызваны

другими патологическими процессами в позвоночнике и окружающих его тканях [14], что должно находить свое отражение при постановке диагноза.

На основании вышеизложенного становится очевидной необходимость пересмотра и расширения перечня заболеваний ОДА профессиональной этиологии. Решение данной проблемы требует последующего обсуждения и междисциплинарного подхода специалистов служб медицины труда, профессиональной патологии, неврологии, организации здравоохранения и медико-социальной службы.

Литература

1. Богачева Л.А., Снеткова Е.П. // Неврол. журн. – 1996. – №2. – С. 4–8.
2. Болезни нервной системы / Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, П.В.Мельничука. – М.: Медицина, 1995. – Т.1. – С. 515.
3. Вознесенская Т.Г. // Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А.М.Вейна. – М., 2001. – С. 217–283.
4. Вознесенская Т.В. Боли в спине. Взгляд невролога // Здоров'я України. – 2006. – №21. – С. 50–51.
5. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. // Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз. – К.: Авіцена, 2006. – С. 142–150.
6. Лагутина Г.Н., Тарасова Л.А., Суворов Г.А., Шардакова Э.Ф. // Медицина труда. – 1994. – №10. – С. 3–6.
7. Международная классификация болезней – МКБ-Х. – Женева: ВОЗ, 1998. – Т.1 (Ч.2). – С. 25–31.
8. Попелянский Я.Ю., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы / Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана. – М.: Медицина, 2001. – С. 293–316.
9. Скоромец А.А., Скоромец Т.А., Шумилина А.П. // Неврол. журн. – 1997. – №6. – С. 53–55.

10. Тревелл Дж.Г., Симонс Д.Г. Миофасциальные боли: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1989. – Т.1–2.

11. Хабилов Ф.Х. Клиническая неврология позвоночника. – Казань, 2002. – 238 с.

12. Штульман Д.Р., Левин О.С. Неврология: Справочник практического врача. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 68 с.

13. Adams R.D., Victor M., Ropper A.N. Pain in the back, neck and extremities // Principles of Neurology. 6th ed. – 1997. – p.2:s.2 Ch.11:P.194–225.

14. Bogduk N., McGurik B. Medical management of acute and chronic low back pain: an evidence-based approach. – Amsterdam: Elsevier, 2002. – P. 532.

15. Hall H. Back pain. Neurological therapeutics: principles and practice / Ed. by G.N.Nostworthy. – London: Martin Dunitz, 2003. – 458 p.

16. Low Back pain initiative. – WHO, 1999. – 4 p.

17. McCulloch G.A., Transfeld E.E. Macnab's Backache. – Baltimore: Williams & Wilkins, 1997. – 312 p.

18. Staal G.B., Hlobil H., Tulder M.W., Waddel G. Occupational health guidelines for the management of low back pain: an international comparison // Occup. Med. – 2003. – V.60. – P. 618–626.

19. Waddel G. The back pain revolution. – Edinburgh: Churchill Livingstone, 1998. – 259 p.

Возніцина К.Б.**БІЛЬ У СПИНІ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)**

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Проведено аналіз проблеми діагностики синдрому болю в нижній ділянці спини, що викликаний патологією кістково-м'язової системи. Розглянуто роль несприятливих фізичних факторів у розвитку зазначеної патології з урахуванням патогенетичних механізмів больового синдрому. Висока медико-соціальна значущість проблеми в клініці професіональних захворювань зумовлює необхідність її міждисциплінарного вивчення з подальшим переглядом переліку захворювань опорно-рухового апарату професійної етіології.

Ключові слова: радикулопатія, діагностика, біль, міофасціальний синдром, остеохондроз

Voznitsyna K.B.**BACK PAIN AS A PROBLEM OF OCCUPATIONAL PATHOLOGY
(REVIEW OF LITERATURE)**

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

The paper highlights the problem of diagnostics of low back pain syndrome (LBP) being the cause of the pathology of the bone-muscular system. The role of unfavourable physical factors in the development of LBP is discussed with due account of pathogenetic mechanisms of the pain syndrome. The high medical and social significance of this problem in the treatment of occupational diseases requires further interdisciplinary studies and review of the list of occupational muscular-skeletal diseases.

Key words: radiculopathies, diagnostics, pain, myofascial syndrome

Поступила: 10.12.2006

Контактное лицо: Возницина К.Б., Институт медицины труда АМН Украины, ул. Саксаганского, 75, Киев 01033, Украина, тел. (044) 284-34-37