УДК 617.57-009+616-001.34]-038-057:622.33

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ ТА ВЕГЕТО-СЕНСОРНУ ПОЛІНЕВРОПАТІЮ РУК У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чернюк В. І.¹, Вітте П. М.¹, Мазур В. В.²¹ ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ² Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

У дослідженні проведено аналіз професійного ризику захворювання на вібраційну хворобу та вегето-сенсорну поліневропатію рук у шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну та надано кількісну оцінку професійних факторів ризику. Установлено, що професії прохідника та гірничого робітника очисного вибою є вібронезбезпечними з високим ризиком виникнення вібраційної хвороби та вегето-сенсорної поліневропатії рук від впливу локальної вібрації.

Ключові слова: дослідження ризиків, шахтарі, вібраційна хвороба, вегето-сенсорна поліневропатія рук, Львівська область

Вступ

Дослідження професійного ризику захворювання — нагальна потреба сьогодення, що слугує створенню нової ідеології профілактичної медицини, яка базується на можливостях прогнозування й попередження несприятливих наслідків для здоров'я професійної діяльності людини [1–3].

Локальна вібрація є одним із поширених шкідливих чинників виробничого середовища. Щорічно захворювання на вібраційну хворобу (ВХ) складають від 10 до 15 % від загальної кількості виявлених професійних захворювань.

До цього слід додати захворювання на вегето-сенсорну поліневропатію (ВСП) рук, провідним етіологічним чинником котрих також може слугувати локальна вібрація в сполученні з впливом інших чинників (переохолодження, фізичні навантаження та ін.) [4].

Типовим прикладом професій із високою питомою вагою захворюваності на ВХ та ВСП рук є професія шахтаря-вугільника [5, 6].

Проте, аналіз захворюваності з позицій оцінки та прогнозування ризику досі в Україні не проводився. Зокрема, це стосується шахтарів, що працюють на шахтах Львівсько-Волинського басейну.

Мета дослідження — провести аналіз професійного ризику захворювань на ВХ та ВСП рук шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басей-

ну, дати кількісну оцінку професійних факторів ризику та запропонувати заходи профілактики.

Завдання роботи:

1. Провести аналіз виявлених випадків захворювань на ВХ та ВСП у шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну за останні 5 років у залежності від професії та стажу роботи.
2. Провести розрахунки абсолютного (AR) та відносного (RR) ризику ВХ та ВСП рук за стажовими категоріями гірничих робітників очисного вибою (ГРОВ) та прохідників.
3. Визначити напрямки профілактичних заходів щодо зменшення ризику ВХ та ВСП рук у гірників вугільних шахт.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження були проведені на шахтах ДП «Львіввугілля» Львівсько-Волинського вугільного басейну. Проаналізовано когорту з 1480 шахтарів (прохідників, ГРОВ) та контрольної групи (працівники допоміжних професій, що не мали контакту з локальною вібрацією). Предметом досліджень було виявлення розповсюдженості захворювань на ВХ та ВСП рук серед досліджуваних контингентів.

Кількісну оцінку професійного ризику захворювання на ВХ та ВСП надано згідно з методичними рекомендаціями [1].

Для розрахунку абсолютного та відносного ризиків побудовано таблиці:

	1-а група (експоновані)	2-а група (не експоновані)	Разом
Захворіло	A	B	A+B
Не захворіло	C	D	C+D
Усього	A+C	B+D	N=A+B+C+D

1. Розрахунки абсолютного ризику (AR) проводили за формулою:

$$AR = \frac{A}{A + C} \cdot 100 \% \quad (1)$$

2. Розрахунки відносного ризику (RR) проводили за формулою:

$$RR = \frac{A/(A+C) \cdot 100 \%}{B/(B+D) \cdot 100 \%} \quad (2)$$

3. Визначення необхідної чисельної вибірки за заданим параметром вірогідності результатів дослідження здійснювали за формулою:

$$n = \frac{1}{p^2 + \frac{1}{N}}, \quad (3)$$

де: n — необхідне число спостережень;

p — вірогідність помилки;

N — загальна кількість шахтарів, які працюють на шахтах ДП «Львіввугілля» Львівсько-Волинського вугільного басейну.

Результати дослідження та їх обговорення

Зареєстровані випадки ВХ та ВСП рук у працівників досліджуваних вугільних шахт, у залежності від професії, наведено в таблиці 1.

За відповідними статистичними розрахунками D. Glenn [7] чисельність вибірки (1480 осіб) є достатньою для отримання вірогідних даних із невізначеністю менше 5 %.

Розрахунки, проведені за формулою (1) свідчать, що в ГРОВ абсолютний ризик захворіти на ВХ становить 0,33 % (95 % довірчий інтервал: 0,07–0,95 %), тоді, як у прохідників він складає 5,5 % (95 % довірчий інтервал: 0,38–7,71 %). Що ж до захворювання на ВСП, то тут абсолютний ризик (AR) у ГРОВ становить 2,73 % (95 % довірчий інтервал: 1,77–4,00 %), а в прохідників 5,5 % (95 % довірчий

інтервал: 0,38–7,71 %). Виявлені відмінності представлено в графічному зображенні на рисунку 1.

Відтак, при порівнянні показників ризику захворювання на ВХ і ВСП у ГРОВ і прохідників за показниками відносного ризику (RR), розрахованого за формулою (2), можливо зробити висновок, що цей ризик (RR) у професії прохідника вищий, ніж у професії ГРОВ — відповідно за діагнозом ВХ у 16,78 разу, а за діагнозом ВСП — у 2 рази.

У таблиці 2 наведено розподіл досліджуваних контингентів шахтарів за професією, стажем роботи та виявлюваністю захворювань на ВХ та ВСП рук.

Результати аналізу отриманих даних на основі розрахунків професійного ризику свідчать, що в ГРОВ абсолютний ризик (AR) захворювання на ВХ у групі зі стажем роботи до 15 років виявлено не було (нульовий ризик), тоді як у групі зі стажем 15–25 років абсолютний ризик становив 0,82 % (95 % довірчий інтервал: 0,10–2,94 %), а в групі зі стажем понад 25 років — 1,85 % (95 % довірчий інтервал: 0,09–9,89 %).

У той же час у прохідників абсолютний ризик (AR) захворювання на ВХ у групі зі стажем роботи до 15 років становив 1,01 % (95 % довірчий інтервал: 0,28–2,57 %), у групі зі стажем роботи 15–25 років — 17,42 % (95 % довірчий інтервал: 2,18–24,99 %), а в групі зі стажем понад 25 років — 10,81 % (95 % довірчий інтервал: 5,21–25,42 %).

Рис. 1. Абсолютний ризик (AR) ВХ та ВСП рук у ГРОВ та прохідників, що працюють у вугільних шахтах Львівської області.

Таблиця 1

Зареєстровані випадки ВХ та ВСП рук у працівників вугільних шахтах Львівської області в різних професіях

Діагноз	ВХ			ВСП рук		
Професія	ГРОВ	Прохідник	Разом	ГРОВ	Прохідник	Разом
Захворіло	3	31	34	25	31	56
Не захворіло	913	533	1446	891	533	1424
Усього працюючих	916	564	1480	916	564	1480

Таблиця 2

Зареєстровані випадки ВХ та ВСП рук професій ГРОВ та прохідник у різних стажових групах шахтарів

Стаж роботи		до 15 років		15-25 років		більше 25 років	
Професія		ГРОВ	Прохідник	ГРОВ	Прохідник	ГРОВ	Прохідник
Захворіло	ВХ	–	4	2	23	1	4
	ВСП	4	2	18	27	3	2
Не захворіло	ВХ	619	391	241	109	53	33
	ВСП	615	393	225	105	51	35
Усього працюючих		619	395	243	132	54	37

Графічно рівні абсолютного ризику (AR) виникнення ВХ у ГРОВ та прохідників наведено на рисунку 2.

Співставлення AR захворюваності на ВХ у досліджуваних професійних групах не дає можливість порівнювати оцінки ступеня ризику на основі показника відносного ризику (RR, формула 2). На основі цього показника можна стверджувати, що ризик захворювання на ВХ у професії прохідника є в 10–17 років вищим у порівнянні з професією ГРОВ.

Результати аналізу захворюваності на ВСП серед ГРОВ засвідчують, що абсолютний ризик (AR) виникнення цих захворювань у групі шахтарів зі стажем роботи до 15 років становить 0,65 % (95 % довірчий інтервал: 0,18–1,65 %); у групі зі стажем 15–25 років – 7,41 % (95 % довірчий інтервал: 1,02–11,45 %), а в групі зі стажем понад 25 років – 5,56 % (95 % довірчий інтервал: 3,82–15,39 %).

У той же час, результати аналізу ризику виникнення захворювань на ВСП серед прохідників свідчать, що абсолютний ризик у групі зі стажем роботи до 15 років становить 0,51 % (95 % довірчий інтервал: 0,06–1,82 %), у групі 15–25 років ризик зростає до 20,45 % (95 % довірчий інтервал: 1,18–28,35 %), а в групі зі стажем понад 25 років ризик дещо зменшується до 5,41 % (95 % довірчий інтервал: 3,25–18,29 %).

Виявлені відмінності в показниках ризику захворюваності на ВСП у ГРОВ та прохідників, у залежності від стажу роботи в професії, наведено на рисунку 3.

Рис. 2. Абсолютний ризик (AR) захворювання на ВХ у ГРОВ (А) та прохідників (Б) у залежності від стажу роботи (покроковий аналіз).

Порівняння AR захворювання на ВСП у ГРОВ та прохідників за принципом оцінки відносного ризику (RR) дає підстави вважати стаж роботи 15–25 років зоною найвищого ризику виникнення цього захворювання в шахтарів. При цьому ризик захворювання на ВСП серед прохідників є в 3 рази вищим у порівнянні з ГРОВ.

Виявлені на основі аналізу ризику відмінності в захворюваності на ВХ та ВСП у різних професійних групах шахтарів слід шукати насамперед, у відмінностях технологічно обумовлених величин вібраційних навантажень та особливостях впливу супутніх шкідливих виробничих чинників (охолоджуючий мікроклімат, фізичне навантаження), що потребує подальших поглиблених епідеміологічних досліджень.

Висновки

1. У структурі професійної захворюваності шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну захворювання ВХ та ВСП рук стабільно займають четверте місце, і складають до 10 % щорічно виявлюваних випадків професійних захворювань.
2. Ризик захворювання ВСП з'являється в ГРОВ при стажі роботи до 15 років, тоді як ризик захворювання ВХ – після 15 років. Зі збільшенням стажу роботи до 25 років ризик захворювання зростає в 2,5 (ВХ) та в 5 разів (ВСП).

Рис. 3. Абсолютний ризик (AR) захворюваності на ВСП рук у ГРОВ і прохідників у залежності від стажу роботи.

3. У професійної групи прохідників ризик захворювання на ВХ з'являється раніше ніж у ГРОВ (при стажі роботи до 15 років) і має більш високі темпи в залежності від стажу роботи (при стажі до 25 років ризик зростає в 17 разів на ВХ та в 40 разів на ВСП рук).
4. Професії прохідника та ГРОВ є вібронебезпеч-

ними з високим ризиком виникнення професійних захворювань від впливу локальної вібрації. Виявлені відмінності в ризику виникнення захворювань ВСП та ВХ у цих професіях імовірно пов'язані з тривалістю вібраційної експозиції та впливом супутніх шкідливих виробничих чинників (мікроклімат, фізичне навантаження).

Література

1. Методичні рекомендації: оцінка виникнення та управління ризиками виробничо-обумовлених захворювань та травм на робочому місці / Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна, П. М. Вітте, М. П. Соколова. – К., 2010. – 20 с.

2. Оценка риска вибрационной патологии у шахтеров / [А. М. Олещенко, Д. В. Суржиков, Л. Н. Шпагина, Е. А. Панаиотти] // Медицина труда и промышленная экология. – 2001. – № 7. – С. 42–44.

3. Ластков Д. О. Оценка профессионального риска для здоровья шахтеров, работающих в выбросоопасных участках шахт / Д. О. Ластков, О. В. Парташ, Л. Н. Ткаченко // Гигиена труда: сб. науч. тр. – К., 2001. – Вып. 31. – С. 18–27.

4. Вищипан В. П. Умови праці, що впливають на розвиток вегетативно-сенсорної поліневропатії у гірників Кривбасу / В. П. Вищипан // Гигиена труда: сборник научных трудов. – 2000. – № 31. – С. 28–31.

5. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. – К.: Авіцена, 2006. – 316 с.

6. Профессиональные заболевания работающих в угольной промышленности Украины / В. В. Мухин, М. А. Стрельников, Н. М. Харковенко, Н. Т. Седова // Здоров'я працюючих: під редакцією В. В. Мухіна. – Донецьк: ФЛП Дмитренко, 2010. – 380 с.; С. 236–244.

7. Glenn D. Sampling the Evidence of Extension Program Impact / D. Glenn // Program Evaluation and Organizational Development, IFAS, University of Florida. PEOD-5. October, 1992. – 5 p.

Чернюк В. І.¹, Вітте П. М.¹, Мазур В. В.²

ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ВЕГЕТО-СЕНСОРНОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ РУК У ШАХТЕРОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ

¹ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины», г. Киев

²Национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов

В работе проведен анализ профессионального риска заболевания вибрационной болезнью и вегето-сенсорной полиневропатией рук у шахтеров Львовско-Волынского угольного бассейна, и дана количественная оценка профессиональных факторов риска. Установлено, что профессии проходчика и горного рабочего очистительного забоя являются виброопасными с высоким риском возникновения вибрационной болезни и вегето-сенсорной полиневропатии рук от влияния локальной вибрации.

Ключевые слова: исследование рисков, шахтеры, вибрационная болезнь, вегето-сенсорная полиневропатия рук, Львовская область

Chernyuk V. I.¹, Vitte P. M.¹, Mazur V. V.²

STUDIES OF THE RISK OF HAND-ARM VIBRATION SYNDROME AND VEGETATIVE-SENSORY POLYNEUROPATHY IN MINERS OF LVIV REGION

¹SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kiev

²Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv

The analysis of occupational risks of hand-arm vibration syndrome and vegetative-sensory arm polyneuropathy in miners of Lviv-Volyn coal region has been made and the quantitative assessment of occupational risk factors is given. It was established that drift-miner and breakage face miner professions are associated with high risk of hand-arm vibration syndrome and vegetative-sensory polyneuropathy of arms, causing by the local vibration.

Key words: occupational risks, miners, hand-arm vibration syndrome, vegetative-sensory polyneuropathy of arms, Lviv region

Надійшла: 11.02.2011 р.

Контактна особа: Вітте П. М., ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033. Тел.: (44) 284-34-27.